

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Кафедра: «Высшая и прикладная математика»

Составители: Блистанова Л.Д., д.ф.-м.н., доцент, Захарова М.В., к.физ.-мат.н., доцент;
Сперанский Д.В., д.тех.н, профессор

**Методические указания и задания на контрольные работы № 3, 4
по дисциплине «Математика»
для студентов 2 курса**

Направление/специальность: **23.03.01 Технология транспортных процессов**

Профиль/специализация: **«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» (ТЕ)**

Москва 2015 г.

Задачи, включенные в контрольную работу, взяты из сборника задач, подготовленного коллективом преподавателей кафедры «Высшая и прикладная математика» РОАТ МГУПС. Все задачи имеют тройную нумерацию, которая включает номер раздела из программы по математике для соответствующей специальности, уровень сложности задачи и порядковый номер задачи. Студент выполняет те задачи, последняя цифра которых совпадает с последней цифрой его учебного шифра. Например, студент, учебный шифр которого имеет последнюю цифру 5, в контрольной работе №3 решает задачи 17.1.15, 17.2.5, 17.2.35, 17.2.55, 17.3.15; в контрольной работе №4 – 17.3.25, 18.1.5, 19.1.5, 19.2.5, 19.3.5.

Перед выполнением контрольной работы студент должен ознакомиться с содержанием разделов математических дисциплин, на освоение которых ориентирована выполняемая контрольная работа. Необходимую учебную литературу студент может найти в рабочей программе по математике для своей специальности (в программе указана как основная, так и дополнительная литература).

Каждая контрольная работа выполняется в отдельной тетради, на обложке которой должны быть указаны: дисциплина, номер контрольной работы, шифр студента, курс, фамилия, имя и отчество студента. На обложке вверху справа указывается фамилия и инициалы преподавателя-рецензента. В конце работы студент ставит свою подпись и дату выполнения работы.

В каждой задаче надо полностью выписать ее условие. В том случае, когда несколько задач имеют общую формулировку, следует, переписывая условие задачи, заменить общие данные конкретными, взятыми из соответствующего номера.

Решение каждой задачи должно содержать подробные вычисления, пояснения, ответ, а также, в случае необходимости, и рисунки. После каждой задачи следует оставлять место для замечаний преподавателя-рецензента. В случае невыполнения этих требований преподаватель возвращает работу для доработки без ее проверки.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3

Дискретный анализ. Теория вероятностей

13.1.1–13.1.10. В разложении $(x^k + y^p)^n$ найти члены, содержащие x^α .

13.1.1. $k = 2, p = 1, n = 10, \alpha = 4$;

13.1.2. $k = 2, p = 1, n = 10, \alpha = 14$;

13.1.3. $k = 2, p = 1, n = 10, \alpha = 12$;

13.1.4. $k = 2, p = 1, n = 10, \alpha = 16$;

13.1.5. $k = 2, p = 1, n = 10, \alpha = 10$;

13.1.6. $k = 3, p = 2, n = 8, \alpha = 9$;

13.1.7. $k = 3, p = 2, n = 8, \alpha = 15$;

13.1.8. $k = 3, p = 2, n = 8, \alpha = 12$;

13.1.9. $k = 1, p = 2, n = 11, \alpha = 7$;

13.1.10. $k = 1, p = 2, n = 11, \alpha = 10$.

13.1.21–13.1.30. Исходя из определений равенства множеств и операций над множествами, доказать тождество и проверить его с помощью диаграммы Эйлера–Венна.

13.1.21. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

13.1.22. $A \cap (B \cup (A \cap C)) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

13.1.23. $A \cup (B \cap (A \cup C)) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

13.1.24. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

13.1.25. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

13.1.26. $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$.

13.1.27. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.

13.1.28. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.

13.1.29. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

13.1.30. $(A \setminus B) \setminus C = (A \setminus C) \setminus B$.

17.1.11. В магазине было 10 покемонов и 15 деджимонов. Покемоны ломаются с вероятностью 0,1, а деджимоны – с вероятностью 0,3. Купленная игрушка сломалась. Какова вероятность, что это деджимон.

17.1.12. Прибор состоит из 6 узлов. Вероятность безотказной работы каждого узла в смену равна 0,9. Найти вероятность того, что за смену откажет ровно 2 узла.

17.1.13. В первом ящике 6 шаров: 1 белый, 2 красных, 3 синих. Во втором ящике 12 шаров: 2 белых, 6 красных, 4 синих. Из каждого ящика вынули по шару. Какова вероятность, что среди вынутых шаров нет синих?

17.1.14. В корзине 20 грибов: 15 лисичек, остальные белые. Вероятность того, что лисичка червивая – 0,01, для белого – 0,3. Какова вероятность того, что взятый гриб червивый.

17.1.15. В магазин вошло 7 покупателей. Вероятность совершить покупку для каждого равна 0,4. Найти вероятность того, что покупку совершат трое.

17.1.16. В урне 7 черных шаров и 3 белых. Наугад вынимают один за другим 2 шара. Найти вероятность того, что оба шара белые.

17.1.17. В букете 15 цветов: 5 гвоздик и 10 хризантем. Гвоздики ломаются с вероятностью 0,2, а хризантемы с вероятностью 0,1. Взятый цветок сломан. Какова вероятность, что это гвоздика.

17.1.18. Рабочий обслуживает 5 станков, каждый из которых может выйти из строя в течении смены с вероятностью 0,1. Найти вероятность того, что из строя выйдет только один станок.

17.1.19. В урне 7 черных шаров и 3 белых. Наугад вынимают один шар и возвращают в урну. Шары перемешивают, затем наугад вынимают второй шар. Найти вероятность того, что оба шара белые.

17.1.20. В коробке 40 пельменей: из них 30 больших, остальные маленькие. Большие разваливаются при варке с вероятностью 0,2, а маленькие с вероятностью 0,4. Какова вероятность, что взятая пельмешка развалилась.

17.2.1. X – число выпадения герба при двух бросаниях монеты. Найти дисперсию случайной величины X .

17.2.2. X – число выпадения надписи при двух бросаниях монеты. Найти дисперсию случайной величины X .

17.2.3. В урне находится 2 белых и 3 черных шара. Наудачу извлекается 2 шара. X – число белых шаров среди отобранных. Найти дисперсию случайной величины X .

17.2.4. X – число выпадений пятерки на игральной кости. Найти дисперсию случайной величины X .

17.2.5. Вероятность того, что прибор исправен равна 0,8. X – число исправных приборов из двух выбранных. Найти дисперсию случайной величины X .

17.2.6. В коробке 5 кубиков пронумерованных от 1 до 5. Мальчик произвольным образом вынимает 2 кубика. X – число кубиков с нечетным номером среди двух выбранных. Найти дисперсию случайной величины X .

17.2.7. Станок-автомат производит 90% изделий первого сорта, 7% второго, а остальные третьего. X – число изделий первого сорта среди двух выбранных. Найти дисперсию случайной величины X .

17.2.8. Вероятность того, что в пакетике с чипсами попадет призовой купон равна 0,1. X – число пакетиков с купонами среди двух выбранных. Найти дисперсию случайной величины X .

17.2.9. В группе из шести человек два отличника. Наугад выбрали двух человек. X – число отличников из выбранных. Найти дисперсию случайной величины X .

17.2.10. 5% лотерейных билетов – выигрышные. X – число выигрышных билетов среди двух выбранных. Найти дисперсию случайной величины X .

17.2.31–17.2.40. Дискретная случайная величина X может принимать только два значения: x_1 и x_2 причем $x_1 < x_2$. Известны вероятность p_1 возможного значения x математическое ожидание $M(X)$ и дисперсия $D(X)$. Найти закон распределения этой случайной величины.

17.2.31. $p_1 = 0,1$; $M(X) = 3,9$; $D(X) = 0,09$.

17.2.32. $p_1 = 0,3$; $M(X) = 3,7$; $D(X) = 0,21$.

17.2.33. $p_1 = 0,5$; $M(X) = 3,5$; $D(X) = 0,25$.

17.2.34. $p_1 = 0,7$; $M(X) = 3,3$; $D(X) = 0,21$.

17.2.35. $p_1 = 0,9$; $M(X) = 3,1$; $D(X) = 0,09$.

17.2.36. $p_1 = 0,9$; $M(X) = 2,2$; $D(X) = 0,36$.

17.2.37. $p_1 = 0,8$; $M(X) = 3,2$; $D(X) = 0,16$.

17.2.38. $p_1 = 0,6$; $M(X) = 3,4$; $D(X) = 0,24$.

17.2.39. $p_1 = 0,4$; $M(X) = 3,6$; $D(X) = 0,24$.

17.2.40. $p_1 = 0,2$; $M(X) = 3,8$; $D(X) = 0,16$.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4

Теория вероятностей. Математическая статистика.

17.2.51–17.2.55. Задана непрерывная случайная величина X своей плотностью распределения вероятностей $f(x)$. Требуется:

- 1) определить коэффициент A ;
- 2) найти функцию распределения $F(x)$;
- 3) схематично построить графики функций $f(x)$ и $F(x)$;
- 4) вычислить математическое ожидание и дисперсию X ;
- 5) определить вероятность того, что X примет значение из интервала (a, b) .

17.2.51.

$$f(x) = \begin{cases} A \cos 2x & \text{при } -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4} \\ 0 & \text{при } |x| > \frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

$$a = \frac{\pi}{6}, \quad b = 2.$$

17.2.52.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 0, \\ Ae^{-x} & \text{при } x > 0. \end{cases}$$

$$a = 1, \quad b = +\infty$$

17.2.53.

$$f(x) = \begin{cases} Ax^2 & \text{при } |x| \leq 3, \\ 0 & \text{при } |x| > 3. \end{cases}$$
$$a = 1, \quad b = 2$$

17.2.54.

$$f(x) = \begin{cases} A \sin 2x & \text{при } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0 & \text{при } x > \frac{\pi}{2} \text{ или } x < 0. \end{cases}$$
$$a = -\frac{\pi}{6}, \quad b = \frac{\pi}{6}$$

17.2.55.

$$f(x) = \begin{cases} Ae^x & \text{при } x \leq 0, \\ 0 & \text{при } x > 0. \end{cases}$$
$$a = -\infty, \quad b = -1$$

17.2.56–17.2.60. Задана непрерывная случайная величина X своей функцией распределения $F(x)$. Требуется:

- 1) определить коэффициент A ;
- 2) найти плотность распределения вероятностей $f(x)$;
- 3) схематично построить графики функций $f(x)$ и $F(x)$;
- 4) вычислить математическое ожидание и дисперсию X ;
- 5) определить вероятность того, что X примет значение из интервала (a, b) .

17.2.56.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ Ax^3 & \text{при } 0 \leq x \leq 3, \\ 1 & \text{при } x > 3. \end{cases}$$
$$a = 1, \quad b = 2$$

17.2.57.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ 1 + Ae^{-x} & \text{при } x \geq 0. \end{cases}$$
$$a = 1, \quad b = +\infty$$

17.2.58.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ A \cos x + 1 & \text{при } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1 & \text{при } x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$
$$a = \frac{\pi}{3}, \quad b = \pi$$

17.2.59.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ A \sin 2x & \text{при } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}, \\ 1 & \text{при } x > \frac{\pi}{4}. \end{cases}$$
$$a = 0, \quad b = \frac{\pi}{6}$$

17.2.60.

$$F(x) = \begin{cases} Ae^x & \text{при } x \leq 0, \\ 1 & \text{при } x > 0. \end{cases}$$
$$a = -\infty, \quad b = -1$$

17.3.11–17.3.20. Нормально распределенная случайная величина X задана своими параметрами a (математическое ожидание) и σ (среднее квадратическое отклонение). Требуется:

- написать плотность вероятности и схематически изобразить ее график;
- найти вероятность того, что X примет значение из интервала $(\alpha; \beta)$;

- в) найти вероятность того, что X отклонится (по модулю) от a не более чем на δ ;
 г) применяя правило “трех сигм” найти границы интервала, содержащего соответствующие значения случайной величины X .

17.3.11. $a = 7, \sigma = 2, \alpha = 6, \beta = 10, \delta = 3.$

17.3.12. $a = 6, \sigma = 1, \alpha = 4, \beta = 7, \delta = 1.$

17.3.13. $a = 5, \sigma = 3, \alpha = 1, \beta = 6, \delta = 2.$

17.3.14. $a = 4, \sigma = 2, \alpha = 5, \beta = 6, \delta = 4.$

17.3.15. $a = 3, \sigma = 1, \alpha = 4, \beta = 6, \delta = 2.$

17.3.16. $a = 2, \sigma = 1, \alpha = 1, \beta = 3, \delta = 2.$

17.3.17. $a = 10, \sigma = 4, \alpha = 5, \beta = 12, \delta = 2.$

17.3.18. $a = 9, \sigma = 5, \alpha = 4, \beta = 12, \delta = 2,5.$

17.3.19. $a = 8, \sigma = 2, \alpha = 5, \beta = 10, \delta = 3.$

17.3.20. $a = 7, \sigma = 3, \alpha = 4, \beta = 8, \delta = 2.$

19.1.1–19.1.10. На заводе имеется N токарных заготовок. Результаты выборочной проверки массы 500 заготовок приведены ниже:

Масса заготовок (кг)	29–30	30–31	31–32	32–33	33–34	Итого
Количество (штук)	6	38	202	198	56	500

Выборка собственно случайная бесповторная. Найти доверительный интервал для оценки средней массы заготовок при уровне доверительной вероятности $\gamma = 0,95$.

Указание: среднеквадратическую ошибку $\tilde{\sigma}$ для бесповторной выборки определяют по формуле $\tilde{\sigma} = \sqrt{\frac{\sigma_B^2}{n} \left(1 - \frac{n}{N}\right)}$, где σ_B – выборочное среднеквадратическое отклонение; $n = 500$.

19.1.1. $N = 10000.$

19.1.2. $N = 9000.$

19.1.3. $N = 8000.$

19.1.4. $N = 7000.$

19.1.5. $N = 6000.$

19.1.6. $N = 5000.$

19.1.7. $N = 11000.$

19.1.8. $N = 12000.$

19.1.9. $N = 13000.$

19.1.10. $N = 14000.$

19.2.1–19.2.10. Данные наблюдений над двумерной случайной величиной (X, Y) представлены в корреляционной таблице. Методом наименьших квадратов найти выборочное уравнение прямой регрессии Y на X . Построить график уравнения регрессии и показать точки $(x; \bar{y}_x)$, рассчитанные по таблице данных.

19.2.1.

X	Y						n_x
	23	25	27	29	31	33	
1	-	-	-	-	1	2	3
3	-	-	-	5	4	1	10
5	-	1	7	10	2	-	20
7	-	2	13	7	-	-	22
9	1	4	15	2	-	-	22
11	2	1	-	-	-	-	3
n_y	3	8	35	24	7	3	80

19.2.2.

X	Y					n_x
	10	20	30	40	50	
3	7	-	-	-	-	7
8	11	5	-	-	-	16
13	-	19	15	5	-	39
18	-	3	15	6	1	25
23	-	-	2	4	4	10
28	-	-	-	-	3	3
n_y	18	27	32	15	8	100

19.2.3.

X	Y				n_x
	9,6	9,8	10,0	10,2	
19,5	2	1	-	-	3
20,0	6	3	2	-	11
20,5	-	4	5	1	10
21,0	-	5	8	5	18
21,5	-	-	2	5	7
22,0	-	-	-	1	1
n_y	8	13	17	12	50

19.2.4.

X	Y					n_x
	34	38	42	46	50	
20	4	-	-	-	-	4
25	2	5	-	-	-	7
30	-	3	5	2	-	10
35	-	-	45	8	4	57
40	-	-	5	7	7	19
45	-	-	-	-	3	3
n_y	6	8	55	17	14	100

19.2.5.

X	Y					n_x
	20	30	40	50	60	
20	7	3	-	-	-	10
30	52	110	13	1	-	176
40	1	14	23	2	-	40
50	-	1	4	6	1	12
60	-	-	-	3	6	9
70	-	-	-	-	3	3
n_y	60	128	40	12	10	250

19.2.6.

X	Y					n_x
	90	100	110	120	130	
2	22	8	-	-	-	30
4	18	15	6	-	1	40
6	12	17	18	14	3	64
8	-	4	19	17	4	44
10	-	-	7	9	6	22
n_y	52	44	50	40	14	200

19.2.7.

X	Y					n_x
	45	55	65	75	85	
10	-	-	-	2	3	5
20	-	-	7	5	7	19
30	-	3	9	12	3	27
40	4	7	13	8	-	32
50	9	8	-	-	-	17
n_y	13	18	29	27	13	100

19.2.8.

X	Y					n_x
	2,15	3,85	5,55	7,25	8,95	
1,95	16	11	-	-	-	27
3,45	13	15	-	-	-	28
4,95	-	9	12	5	5	31
6,45	-	-	-	8	6	14
n_y	29	35	12	13	11	100

19.2.9.

X	Y							n_x
	20	30	40	50	60	70	80	
4	-	-	-	-	-	4	6	10
10	-	-	-	6	6	8	-	20
16	-	1	2	14	3	-	-	20
22	1	5	18	2	-	-	-	26
28	-	4	10	2	-	-	-	16
34	1	5	2	-	-	-	-	8
n_y	2	15	32	24	9	12	6	100

19.2.10.

X	Y					n_x
	17	19	21	23	25	
6,75	3	7	-	-	-	10
8,25	-	9	11	-	-	20
9,75	-	-	33	4	8	45
11,25	-	-	3	10	6	19
12,75	-	-	-	5	1	6
n_y	3	16	47	19	15	100

19.3.1–19.3.10. Известно эмпирическое распределение выборки объема n случайной величины X . Проверить гипотезу о распределении по закону Пуассона генеральной совокупности этой величины. Использовать критерий согласия Пирсона (хи-квадрат) при уровне значимости $\alpha = 0,05$.

Номер	x_i	0	1	2	3	4	5	n
19.3.1	n_i	400	380	165	50	3	2	1000
19.3.2	n_i	240	119	32	6	2	1	400
19.3.3	n_i	270	166	49	10	3	2	500
19.3.4	n_i	337	179	71	9	3	1	600
19.3.5	n_i	200	181	78	31	8	2	500
19.3.6	n_i	114	62	17	4	2	1	200
19.3.7	n_i	500	330	130	29	9	2	1000
19.3.8	n_i	115	62	17	4	1	1	200
19.3.9	n_i	408	365	175	42	6	4	1000
19.3.10	n_i	420	370	146	51	9	4	1000